

СИБИРСКАЯ ЯЗВА

СИБИРСКАЯ ЯЗВА - особо опасная инфекция. Существуют три формы этой болезни: легочная, кишечная и кожная. Наиболее тяжело протекают легочная и кишечная формы.



СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ

- ✓ При работе с зараженными сельскохозяйственными животными (крупным и мелким рогатым скотом, лошадьми, верблюдами, свиньями, оленями др.), загрязненными предметами - через раны и трещины на руках.
- ✓ При употреблении в пищу зараженного мяса, молока, а также воды, недостаточно обработанных термически.
- ✓ Воздушно-капельным путем при вдыхании бацилл.
- ✓ При укусах насекомых (слепней, мух жигалок).

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ

Инкубационный период сибирской язвы - от 2-х до 7-ми дней.

- ✧ При кожной форме сибирской язвы на месте, куда попала инфекция, сначала появляется зуд кожи, возникает гнойное пятно, которое потом начинает пузыриться, через 2-6 дней оно превращается в безболезненную язву, покрывающуюся черным струпом. При этом у больного повышается температура тела до 39-40°C, появляется слабость, болит голова, ломит тело. Самым грозным осложнением при отсутствии специфического лечения является распространение бацилл по всему организму (септицемия).
- ✧ При легочной форме сибирской язвы повышается температура, человека сильно знобит, появляются боли в груди, начинает обильно выделяться мокрота из груди. Через 3-5 дней развивается острая легочная недостаточность, которая приводит к шоку и смерти.
- ✧ Кишечная форма сибирской язвы начинается с сильных болей в животе и пояснице, тошноты, рвоты, жидкого стула с кровью.



ПРОФИЛАКТИКА

В Беларуси против сибирской язвы (для профилактики) создана специальная вакцина, которой вакцинируют лиц, подвергающихся опасности заражения сибирской язвой (работников предприятий по переработке кожевенного сырья и шерсти, мясокомбинатов, ветеринарных работников, работников лабораторий, работающих с возбудителем сибирской язвы).